

## طرق جمع العينات

كجزء من الفحص الطفيلي للبراز، يتطلب البحث المحدد عن *المعوية الفيرومونية* طريقة فحص وأخذ عينات محددة، وهي اختبار سكوتش. يوصى باستلام الكيس الذي يحتوي على مادة الجمع اللازمة (خافض اللسان وشريحة زجاجية ذات جانب مخدش) من مركز السحب وجمع العينة عند الاستيقاظ في الصباح قبل الاغتسال والتغوط.

### تابع جمع العينة على النحو التالي:

- أفرغ الكيس المستلم، واتركه مفتوحًا ويسهل الوصول إليه؛
- اكتب لقب واسم المريض بالقلم الرصاص على الجزء المخدش من الشريحة؛
- ضع شريطاً لاصقاً شفافاً (طوله حوالي 5-6 سم) على خافض اللسان مع وضع الجانب اللاصق للخارج، مع إمساك الطرفين بين الإبهام والسبابة؛
- ألصق خافض اللسان على فتحة الشرج واضغط عليه لبضع ثوانٍ؛
- قم بإصاق الجزء اللاصق من الشريط اللاصق على الشريحة المقدمة، مع تجنب تكون فقاعات هواء؛
- ضع الشريحة في الكيس البلاستيكي دون لمس السطح الخارجي لها و*اغسل يديك بعناية*: في الواقع، غالبًا ما تكون البويضات، إن وجدت، ملقحة ومعديّة بالفعل؛
- أغلق الكيس وسلمه إلى مركز سحب العينات خلال ساعات العمل.



### تنبيه!

بعد إجراء غسل اليدين في نهاية جمع العينات أمرًا مهمًا للغاية: حيث أن البويضات، إذا كانت موجودة، غالبًا ما تكون ملقحة ومعديّة بالفعل.