

إجراء جمع البول لعمل الزراعة البولية

فحص البول الفوري

للنساء

- يجب جمع بول أول تبول في الصباح، حيث يحتوي على كمية بكتيرية أعلى نتيجة لبقاء البول في المثانة طوال الليل.
- كبديل، يمكن جمع البول بعد مرور 3 ساعات على الأقل من آخر تبول.
- قبل الجمع، يجب غسل اليدين جيدًا، وغسل المنطقة التناسلية بعناية وبشكل متكرر باستخدام الماء والصابون، مع إبقاء الشفاه الكبيرة متباعدة باستخدام إحدى اليدين، وتنظيف المنطقة من الأمام إلى الخلف باستخدام اليد الأخرى.
- ثم يتم شطف المنطقة بالماء الجاري وتجفيفها بمناديل ورقية مخصصة للاستخدام مرة واحدة.
- يتم البدء في التبول مع تجاهل الدفعة الأولى (حوالي 20 مل).
- يجب جمع البول التالي للدفعة الأولى في الحاوية المعقمة (متوفرة مجانًا في نقاط سحب العينات)، مع الحرص على فتح الحاوية في اللحظة الأخيرة فقط وتجنب ملامسة الجزء الداخلي للحاوية أو الجانب السفلي من الغطاء بالأصابع، أو الشعر، أو الأعضاء التناسلية.
- يجب إحكام غلق غطاء الحاوية جيدًا وتسليمها خلال ساعتين من وقت الجمع إلى نقطة سحب العينات.
- كبديل، يمكن حفظ العينة في الثلاجة عند +4 درجة مئوية لمدة لا تزيد عن 12 ساعة.

للرجال

- يجب جمع بول أول تبول في الصباح، حيث يحتوي على كمية بكتيرية أعلى نتيجة لبقاء البول في المثانة طوال الليل.
- كبديل، يمكن جمع البول بعد مرور 3 ساعات على الأقل من آخر تبول.
- قبل الجمع يجب غسل اليدين جيدًا، وسحب القلفة وتنظيف رأس القضيب بعناية وبشكل متكرر باستخدام الماء والصابون.
- ثم يتم شطف المنطقة بالماء الجاري وتجفيفها بمناديل ورقية مخصصة للاستخدام مرة واحدة.
- يتم البدء في التبول مع تجاهل الدفعة الأولى (حوالي 20 مل).
- يجب جمع البول التالي للدفعة الأولى في الحاوية المعقمة (متوفرة مجانًا في نقاط سحب العينات)، مع الحرص على فتح الحاوية في اللحظة الأخيرة فقط وتجنب ملامسة الجزء الداخلي للحاوية أو الجانب السفلي من الغطاء بالأصابع، أو الشعر، أو الأعضاء التناسلية.
- يجب إحكام غلق غطاء الحاوية جيدًا وتسليمها خلال ساعتين من وقت الجمع إلى نقطة سحب العينات.
- كبديل، يمكن حفظ العينة في الثلاجة عند +4 درجة مئوية لمدة لا تزيد عن 12 ساعة.

إجراء جمع البول لعمل الزراعة البولوية

من القسطرة

- استخدم حاوية معقمة ذات غطاء لولبي
- أغلق القسطرة بواسطة ملقط على الوصلة ذات الحقيبة، لمدة لا تقل عن ساعة
- قم بتطهير جزء من القسطرة مباشرة تحت الوصلة مع أنبوب الربط؛ أو إذا كانت القسطرة مزودة بجهاز مخصص لجمع العينات، قم بتطهير هذا الجهاز.
- تخلص من بعض المليترات من البول ثم اجمع الجزء الثاني من البول في الحاوية المعقمة، مع الحرص على عدم لمس حوافها.
- سلّم الحاوية إلى نقطة السحب (تتوفر الحاويات المعقمة مجانًا في نقاط سحب عينات Humanitas) في أسرع وقت ممكن ولا تحتفظ بها لمدة تزيد عن 12 ساعة.

من كيس للأطفال/الرضع:

- يمكن استخدام كيس معقم ذاتي الالتصاق لجمع البول.
- يجب تنظيف البشرة في منطقة فوق العانة، وحول الشرج، والأعضاء التناسلية الخارجية جيدًا باستخدام محلول صابوني، وشطف المنطقة جيدًا وتجفيفها بعناية.
- يتم وضع الكيس بحيث يلتصق بمنطقة فوق العانة والعجان، ويجب عدم تركه لأكثر من 45-60 دقيقة.
- فور التبول، يجب إزالة الكيس، وإغلاقه بإحكام ووضعه في حاوية معقمة مخصصة لفحص زراعة البول.
- لا تقم بنقل المحتوى إلى حاوية أخرى.
- سلّم الحاوية إلى نقطة السحب (تتوفر الحاويات المعقمة مجانًا في نقاط سحب عينات Humanitas) في أسرع وقت ممكن.